


Indicador Punto de corte (Desviaciones Estándar DE.)

Peso/Talla > +3

Clasificación antropométrica

OBESIDAD



Acciones a seguir

Referir y asegurar consulta por pediatría y manejo interdisciplinario.


- Suministrar micronutrientes en polvo a niños de 6 a 23 meses de edad según esquema.
- Suministrar vitamina A y hierro si no ha recibido en los últimos 6 meses en niños de 2 a 5 años de edad.
- Desparasitación intestinal en niños mayores de 1 año según el esquema, y si no ha sido desparasitado en los últimos 6 meses.
- Educación alimentaria / alimentación saludable.
- Promoción de la lactancia materna en niño lactante.
- Reforzar actividad física.
- Evitar hábitos sedentarios.
- Programe el próximo control.

Indicador Punto de corte (Desviaciones Estándar DE.)

Peso/Talla
> +2 a ≤ +3

Clasificación antropométrica

SOBREPESO



Acciones a seguir

- Suministrar micronutrientes en polvo a niños de 6 a 23 meses de edad según esquema.
- Suministrar vitamina A y hierro si no ha recibido en los últimos 6 meses en niños de 2 a 5 años de edad.
- Desparasitación intestinal en niños mayores de 1 año según el esquema, y si no ha sido desparasitado en los últimos 6 meses.
- Educación alimentaria / alimentación saludable.
- Promoción de la lactancia materna en niño lactante.
- Reforzar actividad física.
- Evitar hábitos sedentarios.
- Programe el próximo control

Indicador Punto de corte (Desviaciones Estándar DE.)

Peso/Talla
> +1 a ≤ +2

Clasificación antropométrica

RIESGO DE
SOBREPESO



Acciones a seguir


- Suministrar micronutrientes en polvo a niños de 6 a 23 meses de edad según esquema.
- Suministrar vitamina A y hierro si no ha recibido en los últimos 6 meses en niños de 2 a 5 años de edad.
- Desparasitación intestinal en niños mayores de 1 año según el esquema, y si no ha sido desparasitado en los últimos 6 meses.
- Educación alimentaria / alimentación saludable.
- Promoción de la lactancia materna en niño lactante.
- Reforzar actividad física.
- Evitar hábitos sedentarios.
- Programe el próximo control.

Indicador Punto de corte (Desviaciones Estándar DE.)

Peso/Talla
 ≥ -1 a $\leq +1$

Clasificación antropométrica

PESO ADECUADO
PARA LA TALLA



Acciones a seguir


- Suministrar micronutrientes en polvo a niños de 6 a 23 meses de edad según esquema.
- Suministrar vitamina A y hierro si no ha recibido en los últimos 6 meses en niños de 2 a 5 años de edad.
- Desparasitación intestinal en niños mayores de 1 año según el esquema, y si no ha sido desparasitado en los últimos 6 meses.
- Educación alimentaria / alimentación saludable.
- Promoción de la lactancia materna en niño lactante.
- Evitar hábitos sedentarios.
- Programe el próximo control.

Indicador Punto de corte (Desviaciones Estándar DE.)

Peso/Talla
 ≥ -2 a < -1

Clasificación antropométrica

RIESGO DE
DESNUTRICIÓN
AGUDA




Acciones a seguir

- Suministrar micronutrientes en polvo a niños de 6 a 23 meses de edad según esquema.
- Suministrar vitamina A y hierro si no ha recibido en los últimos 6 meses en niños de 2 a 5 años de edad.
- Desparasitación intestinal en niños mayores de 1 año según el esquema, y si no ha sido desparasitado en los últimos 6 meses.
- Educación alimentaria /alimentación saludable.
- Promoción de la lactancia materna en niño lactante.
- Programe el próximo control.

Indicador Punto de corte (Desviaciones Estándar DE.)

Peso/Talla
< -2



Clasificación antropométrica

DESNUTRICIÓN
AGUDA

Acciones a seguir

- Brindar atención, tratamiento y seguimiento, según lo dispuesto en el Lineamiento adoptado por la resolución 2350 de 2020.
- Educación alimentaria / alimentación saludable.
- Promoción de la lactancia materna en niño lactante.
- Programe el próximo control.