


Interrogue y verifique

Con síntomas o signos que puedan sugerir Enterocolitis Necrosante

Realice los exámenes necesarios para la evaluación de sepsis neonatal y para la caracterización de la gravedad de la Enterocolitis Necrosante según la tabla anterior.



Abordaje/Conducta

Hospitalizar o referir URGENTEMENTE a Unidad de atención neonatal según lo indicado en REFIERA.


- Estabilice clínicamente al paciente.
- Nada vía oral
- Líquidos endovenosos seguir recomendaciones de aporte hídrico
- Inicie antibioticoterapia.
- Evaluación, tratamiento y control del dolor neonatal.

Tenga presentes los elemento clave para el manejo según estadios clínicos:

Estadio I:

- Nada vía oral
- Líquidos endovenosos o Nutrición parenteral
- Antibióticos institucionales
- Paraclínicos de control





Abordaje/Conducta

Estadio II:

- Nada vía oral
- Líquidos endovenosos o Nutrición parenteral
- Antibióticos institucionales
- Rx de abdomen cada 6 a 8 horas

Estadio III:

- Nada vía oral
- Líquidos endovenosos o Nutrición parenteral
- Antibióticos institucionales
- Rx de abdomen cada 6 a 8 horas
- Vasopresor – Manejo del choque.
- Intervención quirúrgica

