


Interrogue y verifique


Niño o niña con fisura palatina o labiopalatina.



Abordaje/Conducta

- Si el caso recién se detecta, debe hospitalizar o referir URGENTEMENTE a unidad de atención neonatal según lo indicado en REFIERA.
- Si el caso ya está previamente diagnosticado, verifique cuál es el proceso de atención que ha venido recibiendo y si se han presentado barreras administrativas o si se presentan complicaciones, puesto que, en este caso, también deberá hospitalizar.
- Estabilice clínicamente al paciente.
- Promueva la lactancia materna en posición vertical. La lactancia materna es el alimento que principalmente debe promoverse. Considere el uso de extractores de leche si se presentan dificultades para la succión y para la estimulación de la producción de leche.
- Evite el paso de sonda orogástrica, excepto si el reflejo de succión es muy débil y si se presentan síntomas de atoramiento, tos o desaturación con la alimentación.
- Verificar la garantía de la atención integral en salud y el establecimiento de un plan de cuidado integral.
- Considere el estudio de otros defectos congénitos.
- Asegúrese de que el niño o la niña esté recibiendo atención interdisciplinaria.






Abordaje/Conducta

Tenga presentes las siguientes recomendaciones generales para el manejo:

- Tener siempre limpia la nariz y el paladar.
- Los recién nacidos con labio y paladar hendido todos deben tener cariotipo bandeó G y tener seguimiento por genética clínica.
- Evitar el uso de terminología como "labio leporino", ya que este término es discriminatorio.
- Es importante el acompañamiento de psicología a la familia (padre, madre, abuelos, hermanos) , para la aceptación de la condición del recién nacido, fortalecer ese vínculo afectivo entre madre e hijo, un bebe fuerte y saludable, con labio y paladar hendido, necesita sentir la cercanía de su madre, hay que darle tiempo a la familia para que se adapte a su nueva situación. Si el bebé está despierto y busca el pecho, NO hay razón para no responder a su necesidad, es una experiencia positiva que ayudara a la madre al impacto inicial.
- Es importante evitar la separación madre e hijo, si la condición clínica del recién nacido lo permite.





Abordaje/Conducta

- Es de vital importancia el acompañamiento de un asesor en lactancia materna en la primera hora de vida para acompañar este proceso.
- Cuando el recién nacido ya tiene la placa obturadora puede alimentarse en cualquier posición.

NOTIFICAR: En caso de fisura labiopalatina, se debe diligenciar ficha de notificación obligatoria de defectos congénitos.