Interrogue y verifique

Otitis Media Aguda



Abordaje/Conducta

- Administrar un antibiótico apropiado.
- Secar el oído que supura con mecha.
- Tratar la fiebre y el dolor.
- Enseñar al cuidador los signos de alarma para regresar de inmediato.
- Hacer consulta seguimiento 2 días después
- Enseñar medidas preventivas.
- Tratamiento de elección: Amoxicilina 90mg/kg/día durante 10 días.

Si posterior a los 2 días, en cita de control, persiste con hallazgos clínicos y sintomatología, se debe HOSPITALIZAR en unidad de recién nacidos e iniciar manejo antibiótico parenteral.



Abordaje/Conducta

Peso	Suspensión 250mg/5ml	Suspensión 500mg/5ml	Suspensión 750mg/5ml	FRECUENCIA Y DURACIÓN
2 a 4 Kg	2,5 ml	1,25 ml	0,75	Cada 12 horas durante 10 díias
4 a 6 Kg	5 ml	2,5 ml	1,5 ml	Cada 12 horas durante 10 díias
7 a 9 Kg	7 ml	3,5 ml	2,5 ml	Cada 12 horas durante 10 díias
10 a 12 Kg	10 ml	5 ml	3,5 ml	Cada 12 horas durante 10 díias
13 a 15 Kg	12,5 ml	6,5 ml	4,5 ml	Cada 12 horas durante 10 díias