


Enfermedad Febril de Riesgo Intermedio

Interrogue y verifique

- Edad entre 3 y 6 meses con fiebre $\geq 39^{\circ}\text{C}$ sin foco.
- Ausencia de factores de vulnerabilidad.
- Antecedente de condición crónica pero que está controlada (no está en crisis o en recaída) y no se considera un factor de vulnerabilidad.
- Inapetencia pero con aceptación de la vía oral.
- Fiebre explicada por infección con signos de localización (neumonía, infección de vías urinarias, gastroenteritis, infección de piel o tejidos blandos, etc.), sin indicadores de gravedad, sin deshidratación y sin dificultad respiratoria.
- Luce decaído, pero no gravemente enfermo.
- Respuesta inadecuada al estímulo social: no sonrisa, disminución de actividad, se despierta sin dificultad cuando se estimula.
- Patrón de fiebre recurrente (Tenga en cuenta lo descrito en el apartado de síndromes de fiebre recurrente más adelante) y que no es prolongada.
- Enfermedad que evoluciona en el tiempo esperado o habitual.
- Enfermedad que no progresa con deterioro progresivo.
- Laboratorios con alteraciones, pero sin criterios para considerarse en la clasificación de Enfermedad Febril de Alto Riesgo.
- Entorno de cuidado protector con posibilidades y compromiso por acudir al control a los 2 días.





Interrogue y verifique

También se deben considerar aquellas condiciones, signos o síntomas clasificados como Enfermedad Febril de Alto Riesgo, pero que se hayan interpretado de forma errónea (p.e., aparentaba ictericia pero no tenía hiperbilirrubinemia, mala perfusión, palidez o anemia), en el que se evidencie una rápida mejoría o un adecuado control luego de iniciar el tratamiento y en el que se estime, no habrá deterioro (No aplica para la dificultad respiratoria que haya requerido oxígeno más de 6 horas, ante la presencia de factores de vulnerabilidad o si se estima que no se podrá garantizar el seguimiento estrecho del niño o niña, entre otras condiciones).

Evalué los algoritmos de Enfermedades Transmitidas por Vectores si reside, procede o visitó recientemente un área de riesgo (altitud menor a 2.200 msnm). Clasifique como Enfermedad Febril de Riesgo Intermedio aquellas ETV semaforizadas en amarillo.



Conducta

Para el manejo de la Enfermedad Febril de Riesgo Intermedio, cumpla o garantice los siguientes aspectos:

Abordaje general:

- Clasificación inicial mediante la aproximación general del paciente pediátrico para determinar la necesidad de reanimación: Apariencia, Esfuerzo respiratorio, Signos de mala circulación (Piel pálida, moteada, ceniza o azul).
- Verificar signos clínicos que puedan sugerir sepsis o choque séptico.
- Verificar la presencia de factores de vulnerabilidad.
- De forma específica, para la enfermedad febril de riesgo intermedio, garantice:
- Tome Hemograma, PCR, Uroanálisis y Gram de orina sin centrifugar para orientar la respuesta inflamatoria sistémica y para evaluar la posibilidad de infección de vías urinarias. Estos últimos pueden omitirse si se presentan signos o síntomas de localización de la posible enfermedad febril.
- Si encuentra foco que explique la enfermedad febril, inicie el tratamiento antibiótico correspondiente según los hallazgos, según el estado clínico del niño o niña y según el perfil de resistencia antimicrobiana del lugar de atención.

- Tratar la fiebre.
- Asegurar la hidratación por vía oral.
- Asegurar consulta de seguimiento a los 2 días. Si no es posible garantizar el seguimiento, considere dejar en observación por lo menos por 24 horas para vigilar la evolución.
- Enseñe los signos de alarma para acudir a urgencias inmediatamente.
- Evalúe los algoritmos de Enfermedades Transmitidas por Vectores según riesgo.
- Notifique la condición si es requerido.

