


Interrogue y verifique

Infección de vías urinarias con necesidad de hospitalización

Cuando cumple alguno de los siguientes criterios:

- Edad <3 meses.
- Sepsis.
- Enfermedad grave
- Inmunosupresión.
- Intolerancia a la vía oral
- Limitaciones para el seguimiento o el tratamiento ambulatorio.
- Falta de respuesta a la terapia ambulatoria.
Según valoración individualizada y según factores predisponentes.



Conducta

- Clasifique la enfermedad febril.
- Hospitalizar o referir según lo indicado en REFIERA.
- Garantice la hidratación.
- Garantice la toma del urocultivo previo al inicio del antibiótico.
- Inicie el tratamiento antibiótico intravenoso (Realice la elección según el estado clínico, el perfil de resistencia, el uso previo de antibióticos y la presencia de factores predisponentes particulares).
- Considere el uso de cefalosporinas de primera o segunda generación, o de aminoglucósidos (de acuerdo con la epidemiología local).
- En caso de sepsis debe iniciar cefalosporina de tercera generación.
- En menor de 3 meses inicie manejo combinado con ampicilina + aminoglucósido.
- En primer episodio, considere el estudio con ecografía renal y de vías urinarias ante la confirmación de la infección con el urocultivo.
- Evalúe el control de factores de riesgo para recurrencia como el estreñimiento, la inadecuada técnica miccional, los problemas de higiene y la realización de maniobras retentivas, entre otros.