



Dengue sin signos de alarma pero con condiciones de riesgo



Laboratorio

- Cuadro hemático completo inicial
- Laboratorio, según el tipo de afección asociada (hematocrito, plaquetas, leucocitos, glucosa, electrolitos, entre otros)
- Pruebas diagnósticas de acuerdo con el algoritmo 2.



Conducta terapéutica

- Reposo en cama
- Uso de TILD* durante la fase febril, especialmente durante el día
- Se debe estimular la ingestión de líquidos. Si el paciente no tolera la vía oral o está deshidratado, se debe comenzar la administración de líquidos intravenosos para rehidratarlo o mantenerlo hidratado (según la fórmula de Holliday y Seagar) con lactato de Ringer o solución salina normal al 0,9% en dosis de mantenimiento (2 a 3 ml por kg por hora). Se debe reiniciar el tratamiento oral tan pronto sea posible.
- Control de Signos vitales
- Curva de temperatura
- Balance hídrico: ingesta y salida (informe de las veces que el paciente orina)
Acetaminofén: dosis de 10 mg/kg cada seis horas
- Evitar ASA, dipirona, AINES, antibióticos (a menos que haya cuadro concomitante) y anticoagulantes orales
- Evitar la vía Intramuscular y rectal
- Algoritmo 3 y 4



Control Remitirse a semáforo verde.