CRUP GRAVE

- Estridor asociado a alteración del estado de conciencia
- Dificultad respiratoria
- Saturación de oxígeno al aire ambiente baja de acuerdo con la altura*
- Edad menor de 3 meses
- Puntaje de severidad en la Escala de Westley mayor a 7



- Maneje como enfermedad grave
- Remita con las normas "**REFIERA**"
- Iniciar oxígeno humidificado para lograr saturación adecuada para la altura.
- Administre Dexametasona IM 0,6mg/kg máximo 10mg
- Nebulizar con Adrenalina en dosis de 0,25-0,5 mg/kg de adrenalina, máximo hasta 2,5 ampollas en menores de 2 años, y hasta 5 ampollas en mayores de 2 años, bajo monitorización.
- Epinefrina racémica: 0,05 ml/kg de solución al 2,25 % diluida en 3 ml de solución salina normal (SSN). Dosis máxima: 0,5 ml cada 30 minutos, bajo monitorización; vigilar taquicardia grave, según la edad. Si después de 3 dosis en 90 minutos no hay una mejoría significativa, se debe considerar intubación.
- No utilizar adrenalina por horario, solo según respuesta, su efecto aproximado es de 2 horas, vigilar posible efecto de rebote.
- Líquidos endovenosos y suspender la vía oral.
- Manejo de la fiebre con acetaminofén.
- Minimice situaciones de agitación y angustia para el niño(a).
- Monitoreo estricto de signos vitales.
- No inicie antibiótico de rutina sin embargo considere diagnósticos diferenciales, no administre antitusígenos.
- Individualice manejo para definir toma de paraclínicos.
- Solicite apoyo del profesional más experto de su institución si requiere intubación de urgencia.