


NEUMONÍA


Síntomas respiratorios menores de 15 días de evolución, acompañados de taquipnea, con o sin fiebre y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax cuando hay posibilidad para practicarla.



Abordaje

- Radiografía de tórax en lugares del país con fácil acceso a ella y con la posibilidad de interpretarse máximo a las 6 horas de su solicitud
- Administre antibiótico para el manejo ambulatorio
- Amoxicilina oral en dosis de 90 mg/kg/día por 5 días (no se requiere radiografía si no está disponible pero la clínica es sugestiva)
- Maneje la fiebre con acetaminofén
- Optimice hidratación vía oral
- No se recomienda el uso de tratamientos sintomáticos (antihistamínicos, antitusígenos, descongestionantes, mucolíticos)
- Ante evolución favorable de recomendaciones para manejo en casa
- Informe sobre signos de alarma para reconsultar.
- Canalice para continuar las atenciones de la RPMS





Abordaje

- Consulta de control a las 48 -72 horas
- Se recomienda en todo menor con diagnóstico de neumonía tratado con amoxicilina a 90 mg/kg/día y que presente aparición de signos de peligro, tiraje, cianosis o estridor en las siguientes 72 horas de inicio del tratamiento: clasificarlo como **neumonía grave**, remitirlo a un lugar de mayor complejidad y iniciar Amoxicilina/clavulanato a dosis de 90 mg/kg/día VO por 5 días.
- Se recomienda realizar una radiografía simple del tórax en proyección anteroposterior, para el control o seguimiento de menores de 5 años de edad con neumonía, si a las 72 hora persiste la fiebre y la respiración rápida, tenga una consolidación previa o no