


Sospecha de Tos ferina grave

Definición de caso de tosferina de acuerdo a la edad y que tenga:

- Menos de 6 meses
- Signos de alarma generales
- Signos de dificultad respiratoria- Tirajes
- Saturación baja al medio ambiente, de acuerdo a los rangos según la altitud



Abordaje

- Maneje como **enfermedad grave**.
- Remita con las normas "**REFIERA**".
- **Oxígeno** para mantener saturación de O₂ adecuada de acuerdo a la altitud, con el dispositivo o equipo que se tenga disponible y al cual se adapte el niño.
- **Radiografía de tórax** en lugares del país con fácil acceso a ella y con la posibilidad de interpretarse máximo a las 6 horas de su solicitud.
- **Administre primera dosis de antibiótico lo antes posible de acuerdo al cuadro de tratamiento.**
- Solicite **PCR** de aspirado nasofaríngeo o cultivo según disponibilidad.
- Solicite paraclínicos complementarios según disponibilidad (hemograma).
- **Maneje la fiebre** con acetaminofén.
- **Hidratación vía** oral o intravenosa según tolerancia y necesidad.
- Aislamiento de gotas y contacto.
- **Notifique** inmediatamente.
- **Maneje los contactos.**
- **No administre manejo sintomático de la tos.**