


Tos ferina

Definición de caso de tos ferina de acuerdo a la edad, sin ningún criterio de tos ferina grave.


- Trate a los contactos con antibióticos similar al cuadro de tratamiento (dentro de las siguientes 3 semanas) *Ver recomendaciones a continuación.



Abordaje

- **Radiografía de tórax** en lugares del país con fácil acceso a ella y con la posibilidad de interpretarse máximo a las 6 horas de su solicitud.
- Solicite paraclínicos complementarios según disponibilidad (hemograma)
- **Administre antibiótico lo antes posible de acuerdo al cuadro de tratamiento**
- **Solicite PCR** de aspirado nasofaríngeo o cultivo según disponibilidad
- **Maneje la fiebre** con acetaminofén
- **Hidratación** vía oral
- Aislamiento en casa
- **Notifique** inmediatamente
- **Trate a los contactos** con antibióticos similar al cuadro de tratamiento (dentro de las siguientes 3 semanas) *Ver recomendaciones del cuadro azul
- **No administre manejo sintomático de la tos**
- Recomendaciones de cuidado en casa, indique los signos de alarma para reconsultar.





Abordaje

- Seguimiento a las 48 a 72 horas y cita de control entre los 3 a 5 días posteriores.
- Vigilar la aparición de infección concomitante (neumonía y otitis media), de apnea y de falla respiratoria. La frecuencia de complicaciones es mayor en lactantes menores de seis meses, así como en pacientes con enfermedad cardíaca, pulmonar, muscular o neurológica previa.
- Se recomienda que no reciba visitas en el hogar. Estas medidas deben mantenerse hasta haber completado cinco días de tratamiento con antibióticos cuando se considera que ya no son contagiosos.