


Condición

ENFERMEDAD BUCAL GRAVE

Incluye:

- Inflamación dolorosa del labio, cara, espacio infraorbitario (celulitis).
- Enrojecimiento e inflamación dolorosa localizada con deformación del contorno de la encía.
- Presencia de exudado purulento (absceso periapical).
- Caries cavitacionales.
- Dolor dental (pulpitis).




Abordaje inicial

Manejo

- En presencia de celulitis o compromisos mayores referir.
- para hospitalización, para manejo de infección con antibiótico y para manejo de dolor
- Remitir URGENTEMENTE para tratamiento por odontología en las siguientes 24 horas.
- Iniciar antibiótico oral si hay absceso localizado según recomendación.
- Tratar el dolor.
- Limpiar y sellar cavidad dental en odontología.





Abordaje inicial

Manejo de Absceso dentoalveolar

- Si está localizado en encía y no se extiende a labio: Amoxicilina dosis 45 mg/kg/ día cada 8 horas por 7 a 10 días.
- Si hay celulitis que no involucra surcos: Amoxicilina / Clavulanato dosis 45 mg/kg/día cada 8 horas por 10 días.
- Ampicilina - Alternativa Penicilina G
- Alergia a penicilina: Clindamicina

Manejo Celulitis facial (infección se extiende involucra surcos)

- Iniciar Penicilina cristalina 200000 u/kg / día en 6 dosis o Clindamicina 40 mg/kg/día dividido en 4 dosis por 10 días; el paciente se debe Hospitalizar.

