


Condición

TRAUMA DENTOALVEOLAR

Incluye:

- Cambio de color evidente del diente.
- Fractura evidente del tejido dental.
- Movilidad (no asociada a recambio dental, desplazamiento, extrusión o intrusión del diente).
- Avulsión completa (perdida del diente).
- Lesión de la encía o mucosas bucales.




Abordaje inicial

Manejo

- Descartar compromiso mayor (pérdida de conciencia, compromiso de signos vitales, compromiso de vía aérea, hemorragia).
- Remitir URGENTEMENTE para tratamiento por odontología en las siguientes 24 horas.
- Tratar el dolor con Acetaminofén.
- Dieta líquida.
- Manejo inmediato de avulsión de diente permanente según recomendaciones y remisión inmediata a odontólogo.
- Monitoreo del niño según lesione.
- Examen cuidadoso de la cabeza y el cuello para identificar cualquier traumatismo craneoencefálico grave o lesión de la columna cervical.





Abordaje inicial

- Radiografía dentales: En caso de dolor dental, fracturas, luxación, decoloración o absceso deben tomarse para evaluar la gravedad del desplazamiento o la aparición de una fractura de raíz, fractura ósea o desplazamiento permanente de la yema del diente.
- Descarte sospecha de violencia ante hematomas en varias etapas de curación (indican múltiples incidentes traumáticos), hematomas del surco labial o frenula labial superior desgarrada, hematomas en los tejidos blandos de la mejilla o el cuello (es más probable que las caídas accidentales lesionen la frente o el mentón), marcas de manos humanas en cara o cuello.

