


Condición

ESTOMATITIS Y/O GINGIVITIS, incluye:

- Presencia de vesículas, úlceras o placas en labios, encías, lengua y/o palada.
- Enrojecimiento e inflamación localizada de la encía o mucosa bucal.
- Estomatitis Herpética: vesículas o úlceras.
- Candidiasis: Placas blancas que se retiran con facilidad dejan puntos sangrantes.
- Estomatitis Estreptocócica: Mucosa oral enrojecida con aspecto en gránulos de sal, puede acompañar una faringitis o amigdalitis.



Abordaje inicial

Manejo

- Consulta odontológica y-o médico.
- Tratar la fiebre y el dolor.
- Manejo tópico de las lesiones.
- Hidratar: Dar abundantes líquidos.
- Monitorear signos de alarma.
- Control en 2 días si no mejora la estomatitis.
- Enseñar medidas preventivas específicas.
- Medicación según etiología e indicación.
- Higiene bucal.

Medicación para estomatitis (ver a continuación)



Medicación para estomatitis

Para la definición del manejo debe tenerse en cuenta la etiología, pero en todos los casos de estomatitis, ante la presencia de dolor y fiebre, deben suministrarse analgésicos- antipiréticos (acetaminofén o ibuprofeno), proporcionar abundantes líquidos para evitar la deshidratación, reducir la molestia al comer, reforzar las prácticas de higiene y remitir para control por odontología.

Estomatitis candidiásica

Tratamiento específico con nistatina tópica (4 veces al día por máximo 14 días). Debe suspenderse la nistatina 48 horas después de la curación de las lesiones.

La dosis varía con la edad:

- Recién nacidos: 100.000 unidades, en cada aplicación.
- Menores de 1 año: 200.000 unidades, en cada aplicación.
- Mayores de 1 año: 300.000 a 500.000 unidades, en cada aplicación
- Recuerde, si el niño es lactado, revisar los pezones de la madre y tratar a la madre

Remisión a servicios de odontología.

Estomatitis herpética

El tratamiento es sintomático.

Es muy importante mantener la hidratación.

Resulta efectivo modificar el pH de la cavidad, usando utilizan diferentes compuestos, como el bicarbonato y mezclas que contienen Hidróxido de Aluminio y Magnesio, para aplicación tópica

Remisión a servicios de odontología

Estomatitis estreptocócica

Requiere tratamiento médico de soporte y antibioticoterapia, con Amoxicilina en dosis de 45 mg/kg/día cada 8 horas por 7 días

Adicionalmente debe suministrarse Acetaminofén como antipirético, en dosis de 12-15 mg/kg cada 6 a 8 horas según peso.

Remisión a servicios de odontología

