


Condición


TRAUMA BUCODENTAL CON AVULSIÓN DE DIENTES TEMPORALES



Abordaje inicial

- Observarse el estado general del paciente (soporte de signos vitales, vía aérea, estado de conciencia).
- Minimizar la ansiedad de los padres es fundamental y de los niños y niñas.
- Detener el sangrado aplicando presión por 5 minutos con algodón o gasa.
- Tratar el dolor con Acetaminofén.
- Suministrar dieta líquida mientras se logra la valoración odontológica, para reducir el riesgo de una lesión mayor.
- Realizar limpieza de heridas con suero fisiológico, agua limpia o idealmente con Clorhexidina al 0,12%.
- Los dientes temporales avulsionados, NO deben ser reimplantados, porque se corre el riesgo de lesionar definitivamente los dientes permanentes en formación y de generar otros traumas como el riesgo de la aspiración del diente, que puede llevar a una emergencia médica. Por tanto, debe realizarse la remisión inmediata a odontólogo, para evaluar la magnitud y extensión del trauma, la cicatrización del alvéolo y el manejo del espacio del diente perdido.





Abordaje inicial

- No hay evidencia para recomendar el uso de antibióticos sistémicos en el tratamiento de las lesiones por luxación en la dentición temporal. Sin embargo, el uso de antibióticos queda a discreción del médico cuando los traumas dentoalveolares se acompañan de lesiones de tejidos blandos, o de otras lesiones asociadas o una intervención quirúrgica significativa. Finalmente, el estado médico del niño puede justificar la cobertura con antibióticos.
- Es posible que se requiera un refuerzo contra el tétanos si se ha producido la contaminación ambiental de la lesión, acorde con la valoración médica en un tiempo no mayor de 48 horas.
- Los padres y cuidadores deben ser informados sobre las posibles complicaciones que pueden ocurrir, como inflamación, aumento de la movilidad o infecciones sobreagregadas aun si los niños no manifiestan el dolor. Los padres o cuidadores deben estar atentos a signos de alarma como hinchazón de las encías, presencia de abscesos o cambios de color en otros dientes, para consultar inmediatamente.
- Brindar instrucciones claras sobre la higiene en las zonas afectadas. Adicionalmente orientar sobre la asistencia regular a los controles odontológicos.

