


Condición


TRAUMA BUCODENTAL CON AVULSIÓN DE UN DIENTE PERMANENTE



Abordaje inicial

- Mantenga al paciente tranquilo e informe a los cuidadores sobre la urgencia e importancia de posicionar en el menor tiempo posible el diente en procura de aumentar la probabilidad de éxito del tratamiento.
- Busque el diente y recójalo por la corona del diente, sin tocar la raíz.
- Enjuague el diente solamente con agua fría o con suero fisiológico para remover cualquier suciedad, pero no raspe o cepille el diente para limpiarlo, especialmente la zona de la raíz.
- En lo posible, procure volver a colocar inmediatamente el diente en el alveolo del que fue expulsado teniendo precaución de colocarlo en la forma correcta, guiándose por los demás dientes presentes en boca.





Abordaje inicial

- Una vez que el diente ha vuelto a su posición original en el alvéolo, debe procurarse que el diente mantenga su posición, mediante algún tipo de fijación provisional (gasa, pañuelo o una servilleta), mientras llega al servicio de odontología para el manejo definitivo, en donde se verificará el posicionamiento del diente y se realizará entre otras la fijación del diente si es necesario.
- Si no es posible la reimplantación del diente en el lugar del accidente, o si la reimplantación del diente avulsionado no es factible (p. Ej., paciente inconsciente), coloque el diente, lo antes posible, en un medio de almacenamiento (que en orden de recomendación, a fin de lograr la conservación de las propiedades de los dientes, son: leche, saliva (después de escupir en un vaso), o solución salina, o en último caso de no disponerse de ninguno de los anteriores, solo en agua) y transporte inmediatamente para el manejo de la emergencia por el servicio de odontología. Esto debe hacerse rápidamente para evitar la deshidratación de la superficie de la raíz, que comienza a ocurrir en cuestión de pocos minutos.
- Brindar instrucciones claras sobre la higiene en las zonas afectadas. Adicionalmente orientar sobre la asistencia regular a los controles odontológicos, para el monitoreo del reimplante dental hasta que este se consolide.

