


**Algún riesgo
de cáncer**

Interrogue y verifique

Considere esta clasificación si presenta al menos uno de los siguientes:

- Pérdida de apetito en los últimos 3 meses.
- Pérdida de peso en los últimos 3 meses.
- Cansancio o fatiga en los últimos 3 meses.
- Sudoración nocturna importante, sin causa aparente.
- Palidez palmar o conjuntival leve.
- Linfadenopatía dolorosa o con evolución < 4semanas o con diámetro $\leq 2,5$ cm o consistencia no dura.
- Aumento de volumen en cualquier región del cuerpo con signos de inflamación (celulitis).
- Otorrea asintomática por más de 14 días.





Abordaje/Conducta

- Refiera al niño o niña con pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio, fatiga de 3 meses de evolución o sudoración excesiva a la consulta externa de pediatría para que sea atendido en un plazo máximo de 14 días. Se deben revisar problemas de alimentación y se investigarán enfermedades como tuberculosis, VIH u otra enfermedad crónica.
- Si tiene palidez palmar (incluso leve), solicite hemograma, extendido de sangre periférica y reticulocitos para definir inicio de hierro y afectación de más de una línea celular.
- Trate la causa de la linfadenopatía con antibiótico si es necesario y controle en 14 días. Si no mejora, pero no tiene criterios de probable cáncer, remita a consulta externa de pediatría.
- Trate con antibiótico el proceso inflamatorio que produce aumento de volumen en una región del cuerpo (celulitis) y controle en 14 días. Si no mejora refiere a consulta externa de pediatría.
- Si el niño tiene otorrea asintomática, refiera a valoración por otorrinolaringología. Si se acompaña de dermatitis seborreica crónica, se debe pensar en histiocitosis de células de Langerhans y remitir a un centro de oncología pediátrica.
- Enseñe signos de alarma para regresar de inmediato.
- Promueva la asistencia a la consulta de valoración integral en salud y a los demás procedimientos de la RPMS.

