


# Clasificación

## ESTADO EPILÉPTICO

Uno de los siguientes:


- Se encuentra con crisis epiléptica (convulsiva o no) que ha durado más de 5 minutos.
- Dos o más episodios de crisis durante la consulta sin recuperación de la conciencia.



# Abordaje inicial

- REFERIR urgentemente al hospital según las normas de estabilización y transporte.
- Administrar oxígeno a bajo flujo, posición la vía aérea, revise que no haya obstrucción.
- Realizar glucometría de inmediato, si el niño presenta hipoglicemia corregirla con dextrosa al 10% 5 ml/kg por SNG o vía endovenosa en cinco minutos, tome glucometría de control a los 15 minutos si el bolo fue IV o a los 30 minutos si fue por SNG.
- Acceso venoso e inicie administración de líquidos y medicamentos, si esto no es posible y usted está en capacidad coloque un acceso intraóseo.
- Inicie medicamento: Benzodiazepinas\*.





## Abordaje inicial

Dosificación de **midazolam** para el tratamiento del estado epiléptico en niños.

Bucal / intranasal	0,3 mg / kg (máximo 10 mg)
IV / IO	0,15 mg / kg (máximo 10 (mg))
IM	0,2 mg / kg (máximo 10 mg)

Dosificación de diazepam para el tratamiento del estado epiléptico en niños

IV / IO	0,1-0,4 mg / kg (max 10 mg)
Rectal	0,3-0,5 mg / kg (max 20 mg)

\*Puede administra una dosis promedio de 0.2 mg/kg IV tanto para diazepam como midazolam.

- Controlar signos vitales, observando patrón respiratorio y obstrucción por secreciones

