



Clasificación

EPILEPSIA CON CRISIS GENERALIZADA

Dos o más crisis que cumplen todos los siguientes:

- No presenta aura.
- Presenta pérdida de la conciencia asociada a rigidez generalizada de músculos flexores o extensores (fase tónica), seguida de sacudidas musculares generalizadas*.
- Los movimientos involuntarios son bilaterales y simétricos.
- Mirada central o desviada hacia arriba.
- Posterior a fase tónico, clónica o tónico clónico hay pos-ictal.
- Duración casi siempre mayor a 1 minuto

EPILEPSIA CON CRISIS DE AUSENCIA

Dos o más crisis y todos los siguientes:

- Alteración de conciencia abrupta
- Detención del comportamiento
- Mirada fija
- Aleteo ocular
- Automatismos
- Duración pocos segundos (aproximadamente 10 segundos)- Frecuencia 10 -110 al día
- Desencadenantes: hiperventilación, hipoglicemia y emociones



Abordaje inicial

- Iniciar Acido Valproico (Dosis de inicio 15mg/kg/día con ascenso progresivo cada semana 5-10 mg/kg/ día, dosis total sugerida 30 mg/kg/día).
- Enseñar efectos secundarios del anticonvulsivante.
- Si dispone de dispositivo electrónico se recomienda grabar crisis en video.
- Control en 14 día.
- Enseñar signos de alarma para reconsulta.
- Brinde información en salud, con abordaje biopsicosocial recomendaciones para evitar la estigmatización y la deserción escolar, promoción de actividades recreativas.
- Referir a Neurología Pediátrica o Pediatría según disponibilidad de especialidad en zona geográfica o consulta por Telemedicina con Electroencefalograma; un mes después del inicio del anticonvulsivante tomar hemograma, transaminasas, función tiroidea (TSH y T4) y niveles séricos del medicamento.

