





Clasificación

EPILEPSIA CON CRISIS FOCAL

- Dos o más crisis que inician usualmente con aura, pueden generalizar y uno de los siguientes:
- Movimientos involuntarios o sacudidas localizadas.
- Actividades rítmicas o semirítmicas de un lado de la cara o extremidad.
- Mirada fija sin respuesta al medio.
- Automatismos (muecas, gestos, masticación, chupeteo, movimientos de manos o dedos sin ningún propósito, sonidos, palabras o frases repetitivas), en este caso el niño no recuerda el episodio.





Abordaje inicial

- Iniciar con Carbamazepina (dosis de inicio 10–20 mg/kg/día, aumentar semanalmente progresivamente, dosis máxima efectiva < 35mg/kg/día)
- Enseñar efectos secundarios
- Control en 14 días
- Enseñar signos de alarma para regresar de inmediato
- Si dispone de dispositivo electrónico se recomienda grabar crisis en video.
- Brinde información en salud, con abordaje biopsicosocial recomendaciones para evitar la estigmatización y la deserción escolar, promoción de actividades recreativas.
- Referir a Neurología Pediátrica o Pediatría según disponibilidad de Especialidad en zona geográfica o consulta por Telemedicina con Neuroimagen (Resonancia magnética de cerebro simple), electroencefalograma; un mes después de iniciar la medicación tomar hemograma, transaminasas y niveles séricos.

